

Ноземацид 5 г

Инструкция по применению

Состав и форма выпуска

Торговое наименование лекарственного препарата: Ноземацид®.

Международное непатентованное наименование: окситетрациклин, метронидазол.

Лекарственная форма: порошок для приема внутрь

Ноземацид® в качестве действующих веществ содержит: окситетрациклина гидрохлорид – 60 %, метронидазол – 30 % и вспомогательные вещества.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой порошок от желтого до светло-коричневого цвета.

Фармакологическое действие

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата для ветеринарного применения: противопротозойные средства.

Входящие в состав препарата окситетрациклина гидрохлорид и метронидазол обладают широким спектром действия в отношении возбудителей протозойных инфекций (*Nozema apis*) и облигатных анаэробных инфекций

Ноземацид® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не обладает местнораздражающим и сенсибилизирующим действием.

Ноземацид® малотоксичен для пчел, не оказывает отрицательного влияния на общее состояние, развитие и продуктивность пчелиных семей.

Дозы и способ применения

Лекарственный препарат Ноземацид® применяют с лечебно-профилактической целью при нозематозе пчел в весенний период до основного медосбора или летом, после откачки товарного меда.

Запрещается применение лекарственного препарата менее, чем за 30 дней до начала главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата в товарный мед.

Ноземацид® применяют для лечения нозематоза пчёл весной до начала медосбора, скормливая с канди или сахарным сиропом из расчёта 0,25 г на одну семью пчёл силой 10 улочек.

Ранней весной (до облета пчел) Ноземацид® вносят в медово-сахарное тесто (канди) из расчета 2,5 г препарата на 5 кг канди (или 5,0 г препарата на 10 кг канди) и скармливают пчелам по 0,5 кг на семью.

После весеннего облета Ноземацид® применяют с сахарным сиропом. Для этого 2,5 г препарата растворяют в 50 мл теплой (35 °С – 40 °С) воды и тщательно смешивают с 10 литрами сахарного сиропа, приготовленного в соотношении 1:1 (или 5,0 г препарата также растворяют в 50 мл теплой (35 °С – 40 °С) воды и тщательно смешивают с 20 литрами сахарного сиропа, приготовленного в соотношении 1:1.)

Лечебный сироп готовят непосредственно перед применением и скармливают пчелам дважды с интервалом 5-6 дней, наливая его в верхние кормушки, из расчета 100 мл на 1 рамку с пчелами.

Осенью для профилактики нозематоза лекарственный препарат применяют с сахарным сиропом в тех же дозировках однократно.

Для достижения максимального лечебного эффекта одновременно с лечением пчёл проводят дезинфекцию ульев, сот и рабочего инвентаря согласно инструкции по дезинфекции на пасаеах, по возможности заменяют пчелиную матку на новую плодную.

Мед разрешается использовать в пищевых целях не ранее, чем через 30 суток после окончания применения лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией.

Особые указания

При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для ветеринарного применения. Пустую упаковку из под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Лекарственный препарат запрещается применять пчелам в период главного медосбора, возрастные ограничения отсутствуют.

Побочных реакций и осложнений при использовании лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

Симптомы передозировки лекарственным препаратом у пчел не установлены.

Ноземацид® не следует применять совместно с другими лекарственными препаратами, предназначенными для лечения нозематоза пчел.

Особенностей действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не установлено.

Следует избегать нарушений доз и курса применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

Упаковка

Лекарственный препарат Ноземацид® выпускают расфасованным по 2,5 г и 5,0 г в герметично запаянных пакетах соответствующей вместимости из металлизированной пленки. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Условия хранения

Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 25°C.

Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Лекарственный препарат Ноземацид® отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Срок годности

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

После вскрытия упаковки лекарственный препарат хранению не подлежит.