

Тропидез

Инструкция по применению

Состав и форма выпуска

Лекарственная форма: пластина ветеринарная.

Тропидез в 1 пластине в качестве действующих веществ содержит: тимол – 60 мг, гераниол – 20 мг, а в качестве вспомогательных веществ: эфирное масло гвоздики, эфирное масло лаванды, эфирное масло пихты, шпон лущеный.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой деревянные пластины от светло-желтого до коричневого цвета с запахом эфирных масел.

Фармакологическое действие

Тропидез относится к фармакотерапевтической группе акарицидных лекарственных средств.

Входящие в состав лекарственного препарата тимол и гераниол обладают ярко выраженным акарицидным контактным и репеллентным действием в отношении взрослых форм *Tropilaelaps* spp., *Varroa destructor* и *Braula coeca*, паразитирующих в семьях медоносных пчел.

Эфирные масла гвоздики, лаванды и пихты усиливают эффект действующих веществ препарата.

Тропидез помимо специфического акарицидного действия оказывает также бактерицидное, фунгицидное и инсектицидное действие, помогая пчелиным семьям самостоятельно справляться с другими различными заболеваниями. Применение препарата не вызывает возникновения резистентных популяций клещей.

Тропидез по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), при применении в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-резорбтивного, местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

Тропидез не токсичен для пчел, в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность и продуктивность пчелиных семей.

Дозы и способ применения

Лекарственный препарат Тропидез применяют с лечебно-профилактической целью при тропилелапсозе, варроатозе и браулезе медоносных пчел в весенний и летне-осенний периоды.

Тропидез применяют весной после начала яйцекладки пчелиной маткой и в летне-осенний период после откачки товарного меда. Обработку пчелиных семей проводят при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C.

Лекарственный препарат размещают в ульях из расчета 2 пластины на 10-12 рамок с пчелами. Для семей, отводков и нуклеусов объемом до 6 рамок используют одну пластину, которую подвешивают в центре гнезда. В семьях силой 10-12 гнездовых рамок одну пластину подвешивают между 3 и 4 соторамками, вторую – между 7 и 8 соторамками.

Обработку проводят двукратно. Пластины размещают в ульях на 15 дней, после чего их удаляют и сразу заменяют на новые.

Мед разрешается использовать в пищевых целях не ранее чем через 14 суток после окончания применения лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией.

При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для ветеринарного применения. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Запрещается применение лекарственного препарата во время главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата в товарный мед.

Особые указания

Побочных реакций и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

Симптомы передозировки лекарственным препаратом у пчел не установлены.

Тропидез не следует применять совместно с другими акарицидными лекарственными препаратами.

Особенностей действия лекарственного препарата при первом применении или при его отмене не установлено.

Следует избегать нарушений доз и курса применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применять как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

Мед разрешается использовать в пищевых целях не ранее чем через 14 суток после окончания применения лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией.

Упаковка

Лекарственный препарат Тропидез выпускают расфасованным по 10 пластин в герметично запаянные пакеты из металлизированной пленки. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Условия хранения

Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 25°C.

Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

После вскрытия упаковки лекарственный препарат хранению не подлежит.

Лекарственный препарат Тропидез отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Срок годности

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.